



Cardenal

Paroaria coronata (Miller)

Descripción: Altura de 17 cm. Los adultos tienen un notable copete rojo y capuchón que se extiende hasta el pecho, dorsal plumizo, ventral blanco y pico blancuzco. Los jóvenes son similares a los adultos, con menos rojo que según la edad, llegando a ser solo una tonalidad canela en los más jóvenes, transcurre alrededor de un año en adquirir el plumaje de adulto. Ave perseguida y común en cautiverio.

Dimorfismo Sexual: No existente, algunos autores marcan una pequeña diferencia en la coloración, pero estas son casi imposibles de apreciar en el campo y pueden variar con la edad del individuo.

Ambiente: Bosques secos, sabanas, montes, parques y jardines cerca del hombre.

Distribución Geográfica: Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Argentina. Fue introducido en las Islas de Hawái. La distribución en Chile es según lo detectado en registros.

Alimentación: Se alimenta de semillas, frutas e insectos.

Comportamiento: Confiado, suele andar en parejas o pequeños grupos incluso con otras spp como los Tordos (*Molothrus* sp.) alimentándose en las banquetas de los caminos. Tiene una melodiosa voz.

Reproducción: Entre los meses de septiembre y marzo. Construye en los extremos de las ramas de los árboles una semiesfera de palitos que recubre con pajitas y cerdas. Deposita allí tres huevos verdosos con pintas oscuras, la incubación dura unos 14 días.

Fuentes: <https://www.avesdechile.cl/415.htm>
<http://www.ecoregistros.org/ficha/Paroaria-coronata>

