



Tagüita Pollolla Pitroca

Fulica leucoptera (Viellot)

Descripción: Tiene una longitud total de unos 43 cm De plumaje oscuro, cara y cuello negro, el resto del cuerpo color apizarrado, posee un escudete en su cara y pico amarillo con manchas rojas en la unión de ambos. Patas oliváceas con manchas amarillas y franjas rojas en la tibia; dedos lobados grandes. Ojos rojos.

Dimorfismo Sexual: No existe dimorfismo sexual.

Ambiente: Habita, lagos y lagunas tanto de agua dulce como salobre. Presentes en casi todos los rios y lagunas de su zona de distribución, la Tagua es la más conocida y abundante de las especies de Taguas que se encuentran en el país. Ocasionalmente en el mar, cerca de la costa.

Distribución Geográfica: En Chile desde Coquimbo a Tierra del Fuego.

Alimentación: Principalmente plantas acuáticas y semillas de borde de lagunas.

Comportamiento: Gran capacidad de adaptación.

Reproducción: Anida en zonas bajas entre la vegetación o pajonales. La nidada consta de 4 a 9 huevos de color café con pintas oscuras. El tamaño de los huevos es de 49 a 33 mm.

Situación Actual: Sin riesgo.

Fuentes: <https://www.avesdechile.cl/241.htm>
<http://www.rutaschile.com/Guia-Aves-Detalle.php?N=Tagua>

Fotografía gentileza Sr. Dr. Carlos V. Gómez Lira

