



Cisne de cuello negro

Cygnus melancoryphus (Molina)

Descripción: Cabeza y cuello negro y resto del cuerpo blanco. Pico plomo con excrescencia carnososa (carúncula) roja intensa, patas color carne. Ceja y franja post-ocular larga de color blanco y que alcanza la nuca. Mide entre 110 y 125 cm. Polluelos: Cuando nacen todo el plumaje es blanco, el pico y las patas son gris azulado oscuro. Las plumas de nacimiento son reemplazadas por plumas castañas muy claras. El cuello comienza a oscurecerse cuando ya son del tamaño de los adultos. Al año ya tienen el plumaje blanco y el cuello negro pero la carúncula sobre el pico no se le desarrolla hasta los tres o cuatro años.

Dimorfismo Sexual: No existente en el plumaje, siendo el macho más grande que la hembra, presentando la carúncula roja más desarrollada en la base del pico.

Ambiente: Cuerpos de agua fresca, continentales (dulces y salobres) y marinas, de muy baja profundidad, relativamente protegidas y tranquilas, con poca o sin corriente y cierto grado de eutrofización que permite el crecimiento de una abundante biomasa vegetal sumergida.

Distribución Geográfica: Es natural de América del Sur. Se distribuye desde los 34° hasta Tierra del Fuego y las Malvinas, pudiendo llegar al Trópico de Capricornio en la época migratoria (febrero y junio). Su distribución comprende desde el sur de Brasil hasta Tierra del Fuego. En Chile esta especie se puede encontrar desde Atacama hasta Magallanes. Casual en el Archipiélago de Juan Fernández. Se le considera vulnerable en cuanto a peligro de extinción.

Alimentación: El cisne de cuello negro se alimenta mayormente de vegetales acuáticos, algas y pastos. Es posible que también coma pequeños invertebrados en el agua y que complemente su dieta con algunos insectos. Obtiene su sustento filtrando el agua; introduce el pico en el agua de poca profundidad y ligeramente lo abre y cierra, haciendo que el agua circule por dentro del pico.

El cisne de cuello negro ejerce un impacto sobre la vegetación acuática que forma la pradera sumergida, regulando la biomasa de plantas al alimentarse de ellas por lo que ayuda a mantener los ecosistemas húmedos en estadios primarios de más alta productividad y a preservar estos ambientes.

Comportamiento: Es de costumbres gregarias, forman grupos dentro de los cuales se mantienen individuos emparentados. Son frecuentes los combates territoriales.

Reproducción: Desde octubre a diciembre. Anidan en pajonales a la orilla de las lagunas o en islotes alejados de las riberas. Ponen de 4 a 7 huevos de color blanquecino de 101x 66 mm aprox. Anida en los pajonales más tupidos al borde de las lagunas o en islotes alejados de las riberas, en un nido voluminoso hecho de juncos y pastos. Coloca de 4 a 7 huevos de color blanco sucio y dimensiones de 101 mm. x 66 mm. Aprox.

Fuentes: <http://www.avesdechile.cl/050.htm>
<http://www.ceachile.cl/Cruces/Cisne.htm>
<http://www.rutaschile.com/Guia-Aves-Detalle.php?N=Cisne-de-Cuello-Negro>

