



Cormorán Negro

Phalacrocorax brasilianus brasilianus (Gmelin)

Descripción: Ave acuática grande y de plumaje negro brillante, la longitud es de unos 70-75 cm. y un peso de 1 a 1,5 kg. con un pico en gancho largo color café y una cola larga. El cuello es largo y a menudo en forma de S. El plumaje adulto es principalmente negro, con un parche en la garganta amarillo. Patas negras. Es blanquecino cuando joven.

Dimorfismo Sexual: No existente ni en apariencia ni en tamaño.

Ambiente: Lugares de agua dulce y salada, templadas y frías. En costas, ríos, lagos y zonas pantanosas. Es un ave de gran capacidad de adaptación.

Distribución Geográfica: Extenso rango de distribución en centro y sud América, en todos los ambientes acuáticos existentes, hasta los 5.000 metros, desde el Trópico de Cáncer hasta Tierra del Fuego en Argentina: USA, Cuba, Méjico, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Guayana Francesa, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay. En Chile, a lo largo de toda la zona continental, entre Arica y Tierra del Fuego.

Alimentación: Se alimenta de peces y también de pequeños crustáceos. Se alimenta buceando.

Comportamiento: Son diurnas. Son aves sociables que vuelan en bandadas, aunque son vistas más a menudo solas en parejas a lo largo de los ríos. Cuando va a alimentarse se sumerge en el agua hasta que solo son visibles la cabeza, el cuello y el pico. Estos animales evacúan gran cantidad de excremento, este se caracteriza por ser altamente corrosivo.

Reproducción: En las épocas de apareamiento, los cormoranes cambian su plumaje, haciéndose estos mucho más vistosos, pero estos cambios desaparecen inmediatamente después que las hembras han desovado. Construyen grandes nidos de uno a diez metros sobre el nivel del agua.

Fuentes: <http://www.avesdechile.cl/291.htm>
<https://www.animales.website/el-cormoran/>
<http://www.zoobaq.org/especieani/cormoran.php>

Fotografía gentileza Sr. Dr. Carlos V. Gómez Lira

