



Garza Chica, Garceta Garcita

Egretta thula thula (Molina)

Descripción: Ave de 50 cm de largo, totalmente blanca, de pico negro con base amarilla, de cuello y largos. Estas últimas negras por delante y amarillas por atrás. Patas y ojos amarillos. Tiene largas plumas en la cabeza, dorso y pecho, las cuales se tornan más visibles en la fecha de reproducción.

Dimorfismo Sexual: No existente ni en apariencia ni en tamaño.

Ambiente: Zonas de agua dulce, más frecuente desde el nivel del mar hasta los 1500 metros de elevación, aunque se le documenta hasta los 4100 metros.

Distribución Geográfica: Su ubicación comprende desde los Estados Unidos hasta la Argentina y Chile. Se han documentado individuos de esta especie extraviados en las Azores y en Islandia.

En Chile, se le ve poco en la zona norte, pero es muy numerosa en la zona central, llegando normalmente hasta Llanquihue y Chiloé. Más al sur es escasa, aunque se le puede observar hasta Magallanes.

Alimentación: Se alimenta de peces pequeños, ranas, camarones e insectos acuáticos. La mayoría de los lugares de alimentación son a orillas de espejos de agua, aunque pueden buscar insectos en zonas más secas o pastizales.

Comportamiento: Se desplaza en forma solitaria o en grupos de varios ejemplares. Al anochecer es común que se junte para dormir en grupos numerosos, incluso con otros tipos de garzas. La velocidad del vuelo entre el nido y lugares de alimentación, según mediciones realizadas, es de 35 a 39 km/h. Pueden alejarse de los nidos hasta 20 km para encontrar alimento.

Reproducción: Durante el período nupcial, los machos adquieren un penacho de plumas en la cabeza, y plumas más largas y elegantes que despliegan para exhibirse en su nido y ante los machos rivales en las colonias de nidificación. La postura se compone de tres o cuatro (hasta seis en el norte) huevos de color celeste pálido en una plataforma realizada con pequeñas ramitas. El sitio de nidificación, en ocasiones es compartido con otras especies de garzas. Los huevos, que miden unos 43 por 32 mm y son incubados por ambos padres durante 20 a 24 días, luego de los cuales el polluelo rompe el cascarón.

Fuentes: <http://www.avesdechile.cl/089.htm>
<http://avesdevaldivia.cl/inicio/project/garza-chica/>
http://www.zoowebplus.com/animales/?animal=garza_chica

Fotografía gentileza Sr. Dr. Carlos V. Gómez Lira

