



Tagua Común

Fulica armillata (Viellot)

Descripción: De plumaje oscuro casi negro sólo presenta una pequeña mancha blanca en la zona subcaudal. Presenta un pico y escudo amarillo separados por una línea roja oscura. Sus patas son de color verde amarillentas con las tibias rojas. Su mayor tamaño (50 a 55 cms. de longitud), la diferencia de las otras especies de taguas con las cuales convive.

Dimorfismo Sexual: No existe dimorfismo sexual aparente.

Ambiente: Vive en lagunas y lagos, siendo factible verificar un comportamiento de gran sociabilidad con la convivencia de un gran número de ejemplares en un mismo ambiente.

Distribución Geográfica: En Chile de Coquimbo a Tierra del Fuego. En Ñuble se le encuentra desde el nivel del mar hasta los 1.500 m.s.n.m.

Alimentación: Brotes tiernos de plantas acuáticas, tanto de superficie como de fondo.

Comportamiento: Son inquietas y bulliciosas en gran parte de la mañana de cada día. En la tarde generalmente nadan más silenciosas. Son muy buenas nadadoras y zambullidoras. a tagua común forma grupos sobresalientes y numerosos.

Reproducción: La postura es a fines de septiembre, registrándose las últimas posturas a fines de diciembre. El periodo de incubación es de 27 días. Los pichones nacen con plumones negros en el cuerpo, plumón rojizo en la garganta y cuello, mancha roja en el pico, escudo frontal rojo castaño, y color azul alrededor de los ojos.

Fuentes: <http://www.avesdechile.cl/126.htm>
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-65382011000200005

