



Tagua de Frente Roja

Fulica rufifrons (Philippi y landbeck)

Descripción: De plumaje oscuro, negro pizarra, posee un escudete en su cara color rojo, los que intensifican sus colores y tamaño en época nupcial. Posiblemente la observación detallada de los escudetes también sirva para diferenciar las edades de los diferentes individuos.

Dimorfismo Sexual: No existe dimorfismo sexual.

Ambiente: Prefiere los lugares con mayor densidad de vegetación emergente en variedad de ambientes acuáticos de agua dulce y Juncales. Eventualmente en cuerpos de agua salobre.

Distribución Geográfica: En Chile desde Atacama a Llanquihue, rara en Tierra del Fuego (Ocasional en Malvinas) por todo el país excepto Misiones, norte de Corrientes, este de Formosa y la zona montañosa y árida del noroeste. También se la encuentra en Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay.

Alimentación: Forrajera (pastos, algas, etc.), Pero no deja de ser oportunista y puede alimentarse de insectos, caracoles, pequeños peces, etc.

Comportamiento: Algo desconfiada. Muy nadadora. Camina y vuela poco. Debe carretear para despegar vuelo. Para volar grandes distancias, migrar o desplazarse de un espejo de agua a otro, prefieren la noche.

Reproducción: Construyen su nido sobre una gran plataforma de vegetación acuática. Ubica su nido en lo más denso del juncal. Empolla hasta 8 huevos.

Fuentes: <http://www.avesdechile.cl/242.htm>
<http://www.freebirds.com.ar/238.htm>

Fotografía gentileza Sr. Dr. Carlos V. Gómez Lira

